

Herbafulvo

essencia



Papaya kivonattal

Herbafulvo
essencia



Kézműves, gyógynövény,
fulvosav, arginin, parajdi só
és almapektin tartalmú
étrend-kiegészítő
papaya kivonattal,
természetes édesítőszerrel



GLUTÉN MENTES



100% VEGÁN



CUKORMENTES



A Herbafulvo essencia papaya kivonattal minden összetevője és annak mennyisége megegyezik a Herbafulvo essencia összetevőivel, egy lényegi eltérés van, hogy papaya levél kivonattal van kiegészítve.

A papaya hatásáról



A Karib-szigeteken őshonos, papaya- vagy dinnyefa, ma a trópusok egyik legelterjedtebb haszonnövénye. A japánok a papaya levét emésztési zavarok kezelésére használták. A papayafa levele a növény legértékesebb része. A levél igen gazdag papainban, enzim tartalma 15-szöröse az érett gyümölcsének. A 19. századi amerikai orvosok a papaya levelet tea formájában használták az emésztési zavarok kezelésére.



A levélben és a levélszárból levő papain és a chymopapayn, a legfontosabb hatású enzimek a papayának. A papaya enzimek képesek helyettesíteni a pepszint, kompenzálni az amiláz, a lipáz és a proteáz hiányát, amikor sérül a hasnyálmirigy enzim termelése. Hatékonyságát a belekben uralkodó aktuális pH nem befolyásolja hátrányosan, semleges és enyhén lúgos kémhatáson is jól katalizál. Ez a tulajdonsága különösen hasznos, amikor sósav-hiány van a bélcsatornában. A papaint a legerősebb fehérje emésztő enzimként tartják számon. A papaya rendkívüli hatékonysága az enzimaktivitásban rejlik.

A papain enzim saját tömegének 35-szörösét kitevő fehérje lebontására képes.

A papain akkor tud segíteni, amikor a fehérjebontó-enzimtermelés elégtelen, és párhuzamosan gyomorsav-hiány is van a szervezetben. A rosszul emésztett fehérje bomlásnak indul az emésztőrendszerben, így hozzájárul ahhoz, hogy a szervezetben önmérgező, nem kívánatos anyagok pl. biogén aminok képződnek. A papain, amely a legfontosabb és legerősebb hatású enzimje a papayának, a pepszint és a pankreatint meghaladó mértékben segíti az emésztést. Hatékonyságát a belekben uralkodó aktuális kémhatás (pH) nem befolyásolja hátrányosan. A szakemberek a papaint a legerősebb fehérjeemésztő enzimként tartják számon. Ez elsősorban azoknak fontos, akik fehérjebontó-enzimtermelés elégtelenségben, vagy gyomorsav-hiányban szenvednek.



A papaya levél tea jól kezeli a fermentatív emésztési zavarokat, megszünteti a gyomorégést.

Hatékonyan lebontja a búzaglutént és a szénhidrátokat. Természetes emésztési segédanyagként a papaya levél kiválóan alkalmas az emésztési zavarok kezelésére, és rendkívül hasznos a gyomor-bél traktus bármilyen zavarára. A papaya enyhíti az akut prosztata gyulladást, és nagyon hasznos lehet a jóindulatú prosztata hipertrófia (BPH) és a herpes simplex vírus kezelésében. A papaya leveleket, mint gyógynövényt használják a férgek és más paraziták kezelésére. A papaya az intestinalis paraziták elleni küzdelemben elősegítheti az egészséges emésztőrendszert. A „Journal of Medicinal Food” 2007. májusi kiadásában közzétett tanulmány szerint a papayát bélféreghajtásnál, bélfertőzéseknel kiegészítő kezelésként javasolják fogyasztani.

A papaya levél béta-karotint, kalciumot, karpaint, zsírokat, flavonoloikat, niacint, papint, tannint és C-vitamint tartalmaz nagy koncentrációban.



A tanulmányuk eredményei azt mutatják, hogy a papaya levél tea immunmoduláló tulajdonságai hasznosak lehetnek a betegségek, köztük a rák és allergia kezelésében és megelőzésében. Laboratóriumi állatokkal végzett kísérlet során nyert bizonyítást, hogy a Papaya levél tea véd a gyomorfekély ellen. A vizsgálatban a papaya levélkivonat csökkentette a fekély súlyosságát és erős antioxidáns hatásokat mutatott. Ebből az előzetes tanulmányból arra a következtetésre jutottak, hogy a papaya levél tea a gyomorfekély és a gyomor oxidatív stressz kezelésére alkalmas.

A papaya természetes gyógymódként szolgálhat a gyomorfekélyek kezelésére, a papaya-koncentrátum javította az irritábilis bél szindróma tünetét. Az eredményeket 2013-ban a "Neuro Endocrinology Letters" folyóiratban tették közzé. Aki szeretne foglalkozni a bélrendszeri problémáival, a papaya levél kivonat tökéletes az alternatív egészségügyi célok eléréséhez. Talán a papaya levelek legismertebb tulajdonsága, hogy a szervezetben sok nehezen emészthető táplálékot le tud bontani. A papaya levelek a papain és a chymopapain szuperenzimeket tartalmazzák, amelyek segítik a fehérjék, a búza, a zsír és a szénhidrátok emésztését és felgyorsítják az anyagcserét.

Az emésztési tranzitidő lerövidülésével csökken a szervezetben a zsír felhalmozódásának és a mérgeanyagok felszívódásának a lehetősége. A papayát bélféreghajtásnál, bélfertőzéseknel kiegészítő kezelésként javasoljuk fogyasztani. A rosszul emésztett fehérje az emésztőrendszerben hozzájárul ahhoz, hogy a nyálkás fehérjeanyagok, az ún. mucoproteinek a belek nyálkahártyáira rakódjanak le. Az elégtelen fehérjeemésztés már önmagában is alacsony energiaszintet, a szervezetben önmérgező és egyéb nem kívánatos folyamatokat eredményezhet és egy sor betegség, pl. székrekedés, köszvény, cukorbetegség, magas vérnyomás, stb. hátterében állhat.

“ A papaya rendkívüli hatékonysága az enzimaktivitásban rejlik. ”

A papain felszabadítja a fehérjék építőköveit, az aminosavakat, ez csökkenti az emésztetlen fehérjék rothadási folyamatait, és így jó hatású az immunrendszere is. A papain enzim kiválóan alkalmas a bélfalak megtisztítására minden nem oda való anyagtól (nyálkától, elhalt szövetektől). A papaya fehérjében szinte az összes esszenciális aminosav megtalálható. Ezek közül az arginin, melynek az ondótermelésben és a vér tisztaságának fenntartásában van fontos szerepe.

Az arginin magasabb szintje növeli az izomtónust és csökkenti a szervezetben a zsírfelhalmozódást. Az utóbbi években a papaya a degeneratív betegségek egyik természetes orvosságaként vonult be a köztudatba. Étkezések után fogyasztva fejt ki legeredményesebben hatását. Nem csak a biztos székletet garantálja, hanem az elfogyasztott táplálékok „szakszerű”, gyors lebontását is. Fogyasztása megszünteti a kiadós étkezések utáni kellemetlen teltségérzetet, és puffadást. Az emésztési folyamatok intenzitásának támogatása révén a salakanyagok gyorsabban távoznak a szervezetből.





Rendelje meg most!



06 30 401 0371



rendeles@herbafulvo.hu



Ha áldott állapotban van, vagy gyermekáldást terveznek, kérjük, ne fogyassza, mert ennek megnyugtató tudományos hátterre még nem tisztázott! A trópusi országokban a természeti népek születésszabályozásra használják. A menstruáció elmaradása esetén papaya levelet, éretlen és érett gyümölcsöt esznek nagy mennyiségben. Néhány nap, de legkésőbb egy hét múlva megindul a havi tisztulás, amely egy spontán vetélés. A Sussex-i Egyetem kutatói szerint papain enzim kölcsönhatásba lép a magzat megtartásáért felelős progeszteron hormonnal, ez okozza a spontán vetélést.

Felhasznált irodalom:

- Adebowale Adebiyi, P., Ganesan Adaikan and R. N. V. Prasad : Papaya (Carica papaya) consumption is unsafe in pregnancy: fact or fable? Scientific evaluation of a common belief in some parts of Asia using a rat model, Department of Obstetrics and Gynaecology, National University of Singapore, 10 Kent Ridge Crescent, Singapore, Volume 88, Issue 2, August 2002, pp. 199-203.
- Aravind, G., Debjit Bhowmik, Duraivel S., Harish, G., Department of Pharmacognosy, Nimra College of Pharmacy, Vijayawada, Andhra Pradesh, India, Journal of Medicinal Plants Studies, 2013, Volume:1, Issue:1, 7-15p.
- Farhan Saeed, Muhammad Umair Arshad, Imran Pasha, Rabia Naz, Rizwana Batool, Ammar Ahmed Khan, Muhammad Adnan Nasir & Bilal Shafique (2014) Nutritional and Phyto-Therapeutic Potential of Papaya (Carica Papaya Linn.): An Overview, International Journal of Food Properties, 17:7, 1637-1653.
- Harald W. Tietze: Papaya a gyógyító fa. Magyar kiadás, a kiadó Jakab István, Possum Lap- és Könyvkiadó.
- M Indran; AA Mahmood; UR Kuppasamy: Protective effect of Carica papaya L. leaf extract against alcohol induced acute gastric damage and blood oxidative stress in rats, Department of Molecular Medicine, Faculty of Medicine, University of Malaya, 50603 Kuala Lumpur, Malaysia, West Indian med. j. vol.57 no.4 Mona Sept. 2008
- Muss C1, Mosgoeller W, Enderl T.: Papaya preparation (Carico®) in digestive disorders, Research Center of the International Scientific Group of Preventive medicine, IGAP, Vienna, Austria. Neuro Endocrinol Lett. 2013;34(1):38-46. US National Library of Medicine National Institutes of Health.
- Okeniyi JA, Ogundesi TA, Oyedemi OA, Adeyemi LA.: Effectiveness of dried Carica papaya seeds against human intestinal parasitosis: a pilot study. Department of Paediatrics and Child Health, College of Health Sciences, Obafemi Awolowo University, Ile-Ife, Ilesa, Nigeria. J Med Food. 2007 Mar;10(1):194-6. PubMed. US National Library of Medicine National Institutes of Health